

Pingüino de penacho amarillo (*Eudyptes chrysocome*) en isla Choros, Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

Frederick Toro C.¹, Pablo Arróspide Alonso² & Paula Martínez Palma³

¹Médico veterinario, ONG-Panthalassa.

²Administrador R.N.P.H. , DASP Región de Coquimbo, CONAF.

³DASP Región de Coquimbo, CONAF.

El día 17 de diciembre de 2013, en un tour realizado a las islas de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, se logró fotografiar y registrar la presencia en isla Choros de un ejemplar juvenil de pingüino de penacho Amarillo (*Eudyptes chrysocome*). Este avistamiento ocurrió en el sector sureste de la isla, en plena época de nidificación del pingüino de Humboldt y es el primer registro de esta especie al norte del país, considerando su rango de distribución descrito para Chile desde Cabo de Hornos hasta los 49° de latitud sur aproximadamente.

Esta ave marina, la más pequeña entre las especies de pingüinos crestados, se encuentra en estado de conservación Vulnerable (UICN, 2013). Su hábitat principal corresponde a las aguas subantárticas y a las islas interiores y exteriores de los fiordos y canales australes de la Patagonia chilena. Se presume que su llegada a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, fue siguiendo las corrientes marinas existentes, específicamente la corriente fría de Humboldt. Los días siguientes al avistamiento, no volvió a ser visto por turistas ni por guardaparques de la reserva.

